sp.zn. sukls193024/2025, sukls231276/2025

Příbalová informace pro nálevové sáčky

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ALVISAN NEO léčivý čaj

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 6 týdnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Alvisan Neo a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alvisan Neo užívat
3. Jak se přípravek Alvisan Neo užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Alvisan Neo uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Alvisan Neo a k čemu se používá

Alvisan Neo je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako doplňková léčba při lehce zvýšeném krevním tlaku. Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Alvisan Neo je léčivý čaj určený k perorálnímu podání (podání ústy).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alvisan Neo užívat

Neužívejte přípravek Alvisan Neo

- jestliže jste alergický(á) na nať jmelí, třezalkovou nať, hlohový list s květem, hlohový plod, přesličkovou nať, nať máty peprné, meduňkovou nať nebo heřmánkový květ.
- jestliže jste přecitlivělí na sluneční záření, zejména pokud máte světlou pleť, kvůli obsahu třezalky.
- jestliže máte závažné poruchy nervové soustavy.
- jestliže jste HIV pozitivní a léčíte se inhibitory proteázy.
- jestliže jste po transplantaci orgánů.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Alvisan Neo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při užívání přípravku se doporučuje pravidelně sledovat krevní tlak.

Při užívání přípravku Alvisan Neo je nutné se vyvarovat intenzivnímu UV záření (slunce, solária).

Pokud se během užívání přípravku objeví dušnost, bolest v srdeční krajině, bolest vyzařující do oblasti krku, paží, nadbřišku nebo horní části břicha a otoky nohou, je nutno ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Děti a dospívající

Přípravek Alvisan Neo není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Alvisan Neo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek obsahuje třezalku, o které je známo, že může ovlivňovat účinek mnoha současně podávaných léků včetně hormonální antikoncepce. Proto vždy informujte svého lékaře o užívání přípravků s obsahem třezalky tečkované.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Alvisan Neo se nedoporučuje užívat během těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (řízení vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách). Tuto činnost lze vykonávat pouze s výslovným souhlasem lékaře, nebo nejdříve 4 hodiny po užití přípravku.

3. Jak se přípravek Alvisan Neo užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Doporučená dávka pro dospělé: 2x denně (jeden šálek ráno a jeden šálek večer)

Způsob podání:1 nálevový sáček se přelije šálkem (¼ l) vařící vody a po 15 minutách vyluhování v přikryté nádobě se vyjme. Čaj se nesmí vařit. Pije se ráno a večer. Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před užitím.

Délka léčby

Nástup účinku lze očekávat do 14 dnů po 1. podání.

V případě, že příznaky přetrvávají déle než 6 týdnů nebo objeví-li se nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, je nutná konzultace s lékařem.

Jestliže jste užila více přípravku Alvisan Neo než jste měl/a

Pokud jste užil(a) více přípravku Alvisan Neo než jste měl(a), při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(/a) užít přípravek Alvisan Neo

Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokud máte jakékoli další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzhledem k obsahu třezalky (*Hyperici herba*) existuje u citlivých osob možnost výskytu alergické reakce, četnost výskytu není známa.

U osob se světlou pletí se může vyskytnout fotosenzibilizace (zvýšení citlivosti na sluneční záření).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím webového formuláře
sukl.gov.cz/nezadouciucinky

případně na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10
email: farmakovigilance@sukl.gov.cz
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Alvisan Neo uchovávat

Uchovávejte tento léčivý přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a/nebo přebalu nálevového sáčku za EXP.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Alvisan Neo obsahuje

Jeden nálevový sáček (1,5 g) obsahuje 0,600 g *Visci albi herba* (nať jmelí), 0,300 g *Hyperici herba* (třezalková nať), 0,247 g *Crataegi folium cum flore* (hlohový list s květem), 0,150 g *Crataegi fructus* (hlohový plod), 0,113 g *Equiseti herba* (přesličková nať), 0,030 g *Menthae pip. herba* (nať máty peprné), 0,030 g *Melissae herba* (meduňková nať), 0,030 g *Matricariae flos* (heřmánkový květ).

Jak přípravek Alvisan Neo vypadá a co obsahuje toto balení

Léčivý čaj Alvisan Neo je dodáván jako směs léčivých rostlin rozdrobněných na předepsaný stupeň balená po 1,5 g v nálevovém sáčku z filtračního papíru, opatřeném visačkou na niti a papírovým přebalem v krabičce.

Velikost balení

20 nálevových sáčků po 1,5 g, celková hmotnost obsahu v 1 originálním balení - 30,0 g

Držitel rozhodnutí o registraci

LEROS, s.r.o.
U Národní galerie 470
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Česká republika

Výrobce

LEROS, s.r.o.
B. Hrejsové 1301
696 62 Strážnice
Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Příbalová informace pro řezanou směs

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU

ALVISAN NEO léčivý čaj

Složení

100,0 g čajové směsi obsahuje 40,0 g *Visci albi herba* (nať jmelí), 20,0 g *Hyperici herba* (třezalková nať), 16,5 g *Crataegi folium cum flore* (hlohový list s květem), 10,0 g *Crataegi fructus* (hlohový plod), 7,5 g *Equiseti herba* (přesličková nať), 2,0 g *Menthae pip. herba* (nať máty peprné), 2,0 g *Melissae herba* (meduňková nať), 2,0 g *Matricariae flos* (heřmánkový květ).

Léková forma a obsah balení

léčivý čaj

100 g řezané směsi léčivých rostlin

Použití

Alvisan Neo je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako doplňková léčba při lehce zvýšeném krevním tlaku. Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití. Alvisan Neo je určen k perorálnímu podání (podání ústy).

Kontraindikace

Neužívejte při přecitlivělosti na některou složku přípravku.

Vzhledem k obsahu třezalky neužívejte při přecitlivělosti na sluneční záření.

Dále neužívejte při těžkých poruchách nervové soustavy, u HIV pozitivních pacientů léčených inhibitory proteázy a u pacientů po transplantaci orgánů.

Upozornění

Při užívání přípravku se doporučuje pravidelně sledovat krevní tlak.

Při užívání přípravku Alvisan Neo je nutné se vyvarovat intenzivnímu UV záření (slunce, solária).

Objeví-li se během užívání přípravku dušnost, bolest v srdeční krajině, bolest vyzařující do oblasti krku, paží, nadbřišku nebo horní části břicha a otoky nohou, je nutno ihned vyhledat lékaře.

Přípravek Alvisan Neo se nedoporučuje užívat v těhotenství a v období kojení. Přípravek není určen pro děti a dopívající do 18 let.

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (řízení vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách). Tuto činnost lze vykonávat pouze s výslovným souhlasem lékaře nebo nejdříve 4 hodiny po užití přípravku.

Interakce

Přípravek obsahuje třezalku, o které je známo, že může ovlivňovat účinek mnoha současně podávaných léků včetně hormonální antikoncepce.

Proto vždy informujte svého lékaře o užívání přípravků s obsahem třezalky tečkované.

Dávkování a způsob použití

1 polévková lžíce čajové směsi se přelije šálkem (¼ l) vařící vody a po 15 minutách vyluhování v přikryté nádobě se scedí, čaj se nesmí vařit. Pije se ráno a večer. Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před užitím.

Délka léčby

Nástup účinku lze očekávat do 14 dnů po 1. podání.

V případě, že příznaky přetrvávají déle než 6 týdnů nebo objeví-li se nežádoucí účinky, a to i nežádoucí účinky neuvedené v příbalové informaci, nebo jiné neobvyklé reakce, je nutná konzultace s lékařem.

Nežádoucí účinky

Při doporučeném dávkování a indikacích nejsou známy.

Vzhledem k obsahu třezalky (*Hyperici herba*) existuje u citlivých osob možnost výskytu alergické reakce, četnost výskytu není známa. U osob se světlou pletí se může vyskytnout fotosenzibilizace (zvýšení citlivosti na sluneční záření).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit

také přímo prostřednictvím webového formuláře sukl.gov.cz/nezadouciucinky

případně na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10, email:

farmakovigilance@sukl.gov.cz.Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

EXP:

Lot:

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Registrační číslo

94/615/69-C

Držitel rozhodnutí o registraci

LEROS, s.r.o.

U Národní galerie 470

156 00 Praha 5 – Zbraslav

Česká republika

e-mail: leros@leros.cz

Výrobce

LEROS, s.r.o.

B. Hrejsové 1301

696 62 Strážnice

Česká republika

Informace v Braillově písmu na obalu

alvisan neo

Datum poslední revize textu

9. 10. 2026