

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU THÉ SALVAT

součást žlučníkové diety

Léčivý čaj
Perorální podání

SLOŽENÍ

Agrimoniae herba 0,250 g (řepíková nať), Marrubii herba 0,250 g (jablečníková nať), Boldo folium 0,100 g (boldovníkový list), Taraxaci radix c. herba 0,100 g (smetankový kořen s natí), Frangulae cortex 0,100 g (krušinová kůra), Matricariae flos 0,100 g (heřmánkový květ), Menthae pip. herba 0,100 g (nať máty peprné) v 1,0g nálevovém sáčku.

SLOŽENÍ

Agrimoniae herba 25,0 g (řepíková nať), Marrubii herba 25,0 g (jablečníková nať), Boldo folium 10,0 g (boldovníkový list), Taraxaci radix c. herba 10,0 g (smetankový kořen s natí), Frangulae cortex 10,0 g (krušinová kůra), Matricariae flos 10,0 g (heřmánkový květ), Menthae pip. herba 10,0 g (nať máty peprné) ve 100g čajové směsi.

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný jako součást žlučníkové diety, pokud lékař neurčí jinak. Podporuje tvorbu a vylučování žluče, působí mírně projímavě, proti nadýmání a uvolňuje napětí v bříše. Zmírňuje pocity plnosti.

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 12 let.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ

2 nálevové sáčky se přelijí šálkem (1/4 l) vařící vody a po 5-10 minutách vyluhování v přikryté nádobě se vyjmou. Čaj se nesmí vařit. Pije se co nejteplejší 3x denně půl hodiny před jídlem, po doušcích. Připravuje se vždy čerstvý.

PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ

1 polévková lžíce (5 g) se přelije šálkem (1/4 l) vařící vody a po 15 minutách vyluhování v přikryté nádobě se scedí, čaj se nesmí vařit. Pije se co nejteplejší 3x denně půl hodiny před jídlem, po doušcích. Připravuje se vždy čerstvý.

Bez porady s lékařem užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se během 1 týdne užívání příznaky nezlepší nebo se zhoršují, vyhledejte lékaře.

KONTRAINDIKACE

Přípravek neužívejte při přecitlivělosti na některou složku nebo menthol, v těhotenství a při kojení, při bolestech břicha nejasného původu, při onemocnění jater, při akutním hnisavém zánětu žlučníku (projevuje se bolestí v pravém podžebří, která může vyzařovat pod lopatku, nevolností, zvracením, zácpou nebo průjemem, zvýšenou tělesnou teplotou), při zánětu slepého střeva, zánětlivých střevních onemocněních (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), střevní neprůchodnosti (ileus), při

neprůchodnosti žlučových cest (např. žlučové kameny). Nesmí užívat děti do 12 let.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Velmi zřídka může krušinová kúra způsobit bolesti břicha, křeče a řídkou stolicí, obzvlášť u pacientů s dráždivým střevem. Smetanka může způsobit překyselení žaludku a bolest v žaludeční krajině.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

INTERAKCE

Krušinová kúra může snižovat vstřebávání léčivých přípravků podávaných vnitřně (ústy). Pacienti užívající srdeční glykosidy (léky užívané při onemocněních srdce), antiarytmika (léky užívané při poruchách srdečního rytmu), diureтика (močopudné léky), adrenokortikosteroidy (hormony kůry nadledvin) či lékořici, by se měli před použitím tohoto přípravku poradit s lékařem.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k obsahu smetankového kořene s natí se užívání tohoto přípravku nedoporučuje pacientům se srdečním selháním či selháním ledvin.

Pokud trpíte gastroezofageálním refluxem (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, projevující se pálením žáhy), neměl(a) byste tento přípravek užívat, neboť Vaše potíže mohou zesílit.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného přípravku přetravájí nebo pokud se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

VELIKOST BALENÍ

20 nálevových sáčků po 1,0 g

Hmotnost náplně 20,0 g

VELIKOST BALENÍ

Hmotnost náplně 100,0 g

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 94/620/69-C

Č.šarže

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LEROS, s.r.o.

U Národní galerie 470
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Česká republika
e-mail: leros@leros.cz

VÝROBCE

LEROS, s.r.o.

B. Hrejsové 1301
696 62 Strážnice
Česká republika

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALU

thé salvat

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

5. 6. 2024