sp.zn. sukls315786/2025

Příbalová informace pro nálevové sáčky

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

THÉ SALVAT léčivý čaj

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Thé Salvat a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Thé Salvat užívat
3. Jak se přípravek Thé Salvat užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Thé Salvat uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Thé Salvat a k čemu se používá

Thé Salvat je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako součást žlučníkové diety, pokud lékař neurčí jinak. Podporuje tvorbu a vylučování žluče, působí mírně projímavě, proti nadýmání, uvolňuje napětí v břiše, zmírňuje pocity plnosti. Je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.
Thé Salvat je léčivý čaj určený k perorálnímu podání (podání ústy).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Thé Salvat užívat

Neužívejte přípravek Thé Salvat
- jestliže jste alergický(á) na řepíkovou nať, jablečníkovou nať, boldovníkový list, krušinovou kůru, heřmánkový květ, nať máty peprné, smetankový kořen s natí nebo na menthol;
- jestliže trpíte neprůchodností žlučových cest (např. žlučové kameny) nebo při zánětu žlučových cest (projevuje se bolestí v pravém podžebří, která může vyzařovat pod lopatku, pocitem na zvracení, zvracením, zácpou nebo průjmem, zvýšenou tělesnou teplotou) nebo při jiném onemocnění jater;
- pokud máte zánět slepého střeva nebo jiné zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), bolest břicha neznámého původu, neprůchodná střeva (ileus), omezený až zastavený pohyb střev (atonie);

- jestliže máte závažné stavy dehydratace a ztráty elektrolytů;
- jestliže jste těhotná nebo kojíte;
- jste mladší 12 let.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Thé Salvat se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vzhledem k obsahu smetankového kořene s natí neužívejte tento léčivý přípravek bez porady s lékařem, pokud trpíte srdečním selháním či selháním ledvin.

Pokud máte jícnový reflux (pálení žáhy), vyvarujte se užívání přípravků s obsahem máty peprné, protože ty mohou potíže s pálením žáhy zhoršit.

Děti a dospívající
Vzhledem k obsahu krušinové kůry nesmí tento přípravek užívat děti do 12 let (viz bod 2 Neužívejte přípravek Thé Salvat).

Další léčivé přípravky a přípravek Thé Salvat
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při souběžném užívání jiných léků může dojít k ovlivnění jejich vstřebávání.
Krušinová kůra může vyvolat pokles hladiny draslíku v těle (hypokalémii), což může být nebezpečné v případě, že užíváte léky na srdce jako jsou srdeční glykosidy nebo léky na poruchy srdečního rytmu (antiarytmika), protože jejich účinek se může zesílit a způsobit nežádoucí účinky.

Některé léky na odvodnění (diuretika), kortikoidy nebo lékořice mohou také snižovat hladinu draslíku v krvi a vést k narušení rovnováhy elektrolytů v těle.

Pokud užíváte jakékoli léky na srdce nebo jiné výše zmíněné přípravky, poraďte se před použitím přípravku Thé Salvat se svým lékařem.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Thé Salvat se nesmí užívat během těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Thé Salvat nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Thé Salvat užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování
Doporučená dávka: 3x denně jeden šálek půl hodiny před jídlem.

Způsob podání

2 nálevové sáčky (2,0 g) se přelijí šálkem (¼ l) vařící vody a po 5-10 minutách vyluhování v přikryté nádobě se vyjmou.

Čaj se nesmí vařit. Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím. Pije se co nejteplejší.

Délka léčby

Bez souhlasu lékaře neužívejte přípravek déle než 14 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, je třeba se poradit s lékařem.

Jestliže jste užila více přípravku Thé Salvat než jste měl/a

Pokud jste užil(a) více přípravku Thé Salvat než jste měl(a), při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(/a) užít přípravek Thé Salvat

Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech (frekvence výskytu nežádoucích účinků není známa) se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

- Možnost vzniku hypersenzitivní reakce na některou léčivou látku přípravku u přecitlivělých osob
- Zhoršení jícnového refluxu a zesílení potíží s pálením žáhy

Při dlouhodobém užívání nebo překročení dávkování se se mohou vyskytnout:

- Bolest a křeče v břiše, zejména u pacientů s dráždivým střevem
- Žlutavé nebo červeno-hnědé zabarvení moči
- Bílkovina nebo krev v moči
- Řídká stolice

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím webového formuláře sukl.gov.cz/nezadouciucinky

případně na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 49/48

100 00 Praha 10

e-mail: farmakovigilance@sukl.gov.cz

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Thé Salvat uchovávat

Uchovávejte tento léčivý přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a/nebo přebalu nálevového sáčku za „EXP“.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Thé Salvat obsahuje

Jeden nálevový sáček (1,0 g) obsahuje 0,250 g *Agrimoniae herba* (řepíková nať), 0,250 g *Marrubii herba* (jablečníková nať), 0,100 g *Boldo folium* (boldovníkový list), 0,100 g *Taraxaci radix c. herba* (smetankový kořen s natí), 0,100 g *Frangulae cortex* (krušinová kůra), 0,100 g *Matricariae flos* (heřmánkový květ), 0,100 g *Menthae pip. herba* (nať máty peprné).

Jak přípravek Thé Salvat vypadá a co obsahuje toto balení

Léčivý čaj Thé Salvat je dodáván jako směs léčivých rostlin rozdrobněných na předepsaný stupeň balení po 1,0 g v nálevovém sáčku z filtračního papíru opatřeném visačkou na niti a papírovým přebalem, v krabičce.

Velikost balení

20 nálevových sáčků po 1,0 g, celková hmotnost obsahu v 1 originálním balení - 20,0 g

Držitel rozhodnutí o registraci

LEROS, s.r.o.
U Národní galerie 470
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Česká republika

Výrobce

LEROS, s.r.o.
B. Hrejsové 1301
696 62 Strážnice, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU

THÉ SALVAT léčivý čaj

Složení

100 g čajové směsi obsahuje: 25,0 g *Agrimoniae herba* (řepíková nať), 25,0 g *Marrubii herba* (jablečníková nať), 10,0 g *Boldo folium* (boldovníkový list), 10,0 g *Taraxaci radix c. herba* (smetankový kořen s natí), 10,0 g *Frangulae cortex* (krušinová kůra), 10,0 g *Matricariae flos* (heřmánkový květ), 10,0 g *Menthae pip. herba* (nať máty peprné).

Léková forma a obsah balení

léčivý čaj

100 g řezané a neřezané směsi léčivých rostlin

Použití

Thé Salvat je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako součást žlučníkové diety, pokud lékař neurčí jinak. Podporuje tvorbu a vylučování žluči, působí mírně projímavě, proti nadýmání a uvolňuje napětí v břiše. Zmírňuje pocity plnosti.

Přípravek je určený pro dospělé a dospívající od 12 let.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Thé Salvat je léčivý čaj určený k perorálnímu podání (podání ústy).

Kontraindikace

Neužívejte při přecitlivělosti na některou složku tohoto léčivého přípravku nebo menthol, při neprůchodnosti žlučových cest (např. žlučníkové kameny), zánětu žlučových cest (cholangitida) (projevuje se bolestí v pravém podžebří, která může vyzařovat pod lopatku, pocitem na zvracení, zvracením, zácpou nebo průjmem, zvýšenou tělesnou teplotou), nebo jiném onemocnění jater, při zánětlivých onemocněních střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, zánět slepého střeva), při bolesti břicha neznámého původu, při neprůchodnosti střev (ileus), omezeném až zastaveném pohybu střev (atonie), při závažných stavech dehydratace a ztráty elektrolytů, v případě těhotenství a kojení, u dětí ve věku do 12 let.

Upozornění

Vzhledem k obsahu smetankového kořene neužívejte tento léčivý přípravek bez porady s lékařem, pokud trpíte srdečním selháním či selháním ledvin.

Pokud trpíte jícnovým refluxem (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, projevující se pálením žáhy), neměl(a) byste tento přípravek užívat, neboť se vaše potíže mohou zhoršit.

Vzhledem k obsahu krušinové kůry nesmí tento léčivý přípravek užívat děti do 12 let.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Tento léčivý přípravek se nesmí užívat během těhotenství a v období kojení.

Thé Salvat nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Interakce

Při souběžném užívání jiných léků může dojít k ovlivnění jejich vstřebávání.

Krušinová kůra může vyvolat pokles hladiny draslíku v těle (hypokalémii), což může být nebezpečné v případě, že užíváte léky na srdce jako jsou srdeční glykosidy nebo léky na poruchy srdečního rytmu (antiarytmika), protože jejich účinek se může zesílit a způsobit nežádoucí účinky.

Některé léky na odvodnění (diuretika), kortikoidy nebo lékořice mohou také snižovat hladinu draslíku v krvi a vést k narušení rovnováhy elektrolytů v těle.

Pokud užíváte jakékoli léky na srdce nebo jiné výše zmíněné přípravky, poraďte se před použitím přípravku Thé Salvat se svým lékařem.

Dávkování a způsob použití

1 polévková lžíce (5 g) se přelije šálkem (¼) vařící vody a po 15 minutách vyluhování v přikryté nádobě se scedí. Čaj se nesmí vařit. Pije se co nejteplejší 3x denně půl hodiny před jídlem, po doušcích. Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před užitím.

Délka léčby

Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, je třeba se poradit s lékařem. Pokud příznaky přetrvávají déle než 14 dnů nebo se objeví nežádoucí účinky neuvedené v příbalové informaci, poraďte se s lékařem.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech (frekvence výskytu není známa) se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

Možnost vzniku alergické reakce na některou léčivou látku přípravku u přecitlivělých osob

Zhoršení jícnového refluxu a zhoršení potíží s pálením žáhy.

Při dlouhodobém užívání nebo překročení doporučeného dávkování se mohou vyskytnout:

- Bolest a křeče v břiše, zejména u pacientů s dráždivým střevem.
- Žlutavé nebo červeno-hnědé zabarvení moči
- Bílkovina nebo krev v moči
- Řídká stolice

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím webového formuláře sukl.gov.cz/nezadouciucinky

případně na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 49/48

100 00 Praha 10

e-mail: farmakovigilance@sukl.gov.cz

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Lot:
EXP:

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Držitel rozhodnutí o registraci
LEROS, s.r.o.
U Národní galerie 470
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Česká republika
e-mail: leros@leros.cz

Výrobce
LEROS, s.r.o.
B. Hrejsové 1301
696 62 Strážnice
Česká republika

Registrační číslo
94/620/69-C

Informace v Braillově písmu
thé salvat

Datum poslední revize textu

9. 10. 2026